

The protective role of grape seeds oil on damage induced by iron overload on thyroid gland in male rabbite

**الدور الوقائي لزيت بذور العنب على التلف الناتج من فرط الحديد على الغدة الدرقية
في ذكور الارانب**

هبة علوان عبد السلام وفاق جبوري البازى
جامعة كربلاء

*مستل من رسالة ماجستير للباحث الاول

الخلاصة

تهدف هذه الدراسة معرفة الدور الوقائي لزيت بذور العنب الاسود *Vitisvinifera* والديسفروكسامين ضد التلف الحاصل في الغدة الدرقية والمستحدث بفرط الحديد في ذكور الارانب . تم استخدام (25) من ذكور الأرانب البالغة والتي قسمت عشوائياً إلى خمسة مجتمعات متساوية (خمسة حيوانات / مجموعة) ، حققت المجموعة الأولى (G1) 20 مل / كغم من الماء المقطر وعدت كمجموعة سيطرة ، وحققت المجموعة الثانية (G2) 20 ملغم / كغم من مادة دكستران الحديد بواقع جرعة واحدة في الأسبوع الأول ، جرعتان في الأسبوع الثاني ، ثلاثة جرع في الأسبوع الثالث واربعة جرع في الأسبوع الرابع ، أما المجموعة الثالثة (G3) فقد حققت 20 ملغم / كغم من دكستران الحديد وجرعت فموياً يومياً بـ 0.5 مل/كغم من زيت بذور العنب ، في حين حققت حيوانات المجموعة الرابعة (G4) 20 ملغم / كغم من دكستران الحديد مع حقن تحت الجلد (SC) 10 ملغم / كغم من مادة الديسفروكسامين بواقع جرعة واحدة في الأسبوع الأول ، جرعتان في الأسبوع الثاني ، ثلاثة جرع في الأسبوع الثالث واربعة جرع في الأسبوع الرابع لكل مادة . أما المجموعة الخامسة (G5) فقد حققت 20 ملغم / كغم من دكستران الحديد مع حقن تحت الجلد (SC) 10 ملغم / كغم من مادة الديسفروكسامين جرعت فموياً يومياً بـ 0.5 مل/كغم من زيت بذور العنب .

جمعت عينات الدم بعد تجويع الحيوانات لفترة المساء وحتى الصباح في فترة ماقبل المعاملة وبعد مرور أسبوعين حتى نهاية التجربة لدراسة المعايير التالي : قياس مستويات هرمون T_3 ، هرمون الثايروكسين T_4 والهرمون المحفز للدرقية TSH .

اظهرت نتائج هذه التجربة ان الحقن العضلي لدكستران الحديد أدى الى حدوث انخفاض معنوي ($P<0.05$) في تركيز هرمون T_3 وهرمون الثايروكسين T_4 وحدوث ارتفاع معنوي ($P>0.05$) في مستويات الهرمون المحفز للدرقية TSH مقارنة مع مجموعة السيطرة ، فيما اظهرت المجموعة المعاملة بذور العنب والمعرضة لفرط الحديد باستخدام مادة دكستران الحديد عدم وجود فروق معنوية في مستويات الهرمونات T_3 ، T_4 و TSH ،اما المجموعة التي تعرضت للحقن بمادة الديسفروكسامين فقد سجلت انخفاض معنوي في مستوياته هرمون T_3 و هرمون الثايروكسين T_4 وحدوث ارتفاع معنوي ($P<0.05$) في تركيز الهرمون المحفز للدرقية TSH.

اظهرت نتائج القطيع النسجي صغر حجم الجريبات الدرقية ونقصان ملحوظ في مستوى الغروان للغدة الدرقية بعد الحقن العضلي لدكستران الحديد Iron dextran ،اما بالنسبة للمجموعة التي حققت بذور العنب بفرط الحديد وجرعت فموياً بذور العنب فقد لوحظ المظاهر الطبيعي لنسيج الغدة الدرقية مقارنة مع مجموعة السيطرة ،اما المجموعة التي تعرضت للحقن بمادة الديسفروكسامين فقد اظهرت نقصان ملحوظ في مستوى الغروان للغدة الدرقية بعد الحقن بمادة الديسفروكسامين يستنتج من الدراسة الحالية الدور الوقائي لزيت بذور العنب الاسود *Vitisvinifera* ضد التأثير الضار لفرط الحديد في الغدة الدرقية وتؤكد افضليته على مادة الديسفروكسامين .

Abstract

This study was carried out to investigate the protective role of black grape seeds oil *Vitisvinifera* on thyroid damage induced by iron overload in male rabbits . Twenty five adult male rabbits were divided into five groups (5/group) , the first group was injected with 20 ml/kg distal water and served as control group (G1) . Rabbits in the second group were injected with 20 mg/kg iron dextran with one dose in the first week , two in the second week , three in the third week and four dose in the fourth week (G2). Rabbits in the third group (G3) were inject with 20 mg/kg iron dextran and intubated orally and daily with ED50 of black grape seeds oil which equal to 0.5 ml/kg, while the rabbits in the fourth group (G4) were injected 20 mg/kg iron

dextran with SC injection 10 mg/kg desferrioxamine at one dose in the first week , two in the second week , three in the third week and four dose in the fourth week for each one . Rabbits of the last group were injected 20 mg/kg iron dextran, 10 mg/kg desferrioxamine and 0.5 ml/kg black seeds oil.

Fasting blood samples were collected at pretreated , after two weeks and at the end of experiment to study the following parameters : the levels of T₃, T₄ and TSH hormones

The results revealed intramuscular injection of iron dextran caused significant decrease (p<0.05) in levels of T₃ and T₄ hormones ,and significant increase (p<0.05) in levels of TSH hormone Comparative with control group .

The group that treated with black grape seeds oil and exposure to iron overload by iron dextran revealed no significant difference was observed in T₃, T₄ and TSH hormones.

The group that was exposed to injection with desferrioxamine revealed significant decrease (p<0.05) in T₃ and T₄ hormones , and significant increase (p<0.05) in concentrations of TSHhormone . Histological section revealed that iron overload caused significant decrease of colloid in thyroid gland, while the results showed normal feature of in thyroid tissue after oral gavages of grape seeds oil comparative with control group, and decrease of colloid after injection of desferrioxamine.

In conclusion , results of this study confirm the protective role of black grape seeds oil against deleterious effect of iron overload in thyroid gland , and documented the prevalence of black grape seeds oil up on desferrioxamine

المقدمة Introduction

يعتبر الحديد احد العناصر الغذائية الأساسية لاغلب الكائنات الحية ، ويلعب دورا رئيسا في عدد من الوظائف الحيوية ، اذ يشكل جزءا اساسيا للعديد من الانزيمات والبروتينات التي تشارك في عملية تنظيم الأيض [1] كما انه يشترك في العديد من العمليات الخلوية مثل تحرير الطاقة ودوره كمرافق انزيمي في نقل الاوكسجين في كل من بروتين الهيموكلوبين Hemoglobin والماليوكلوبين Myoglobin و في انزيمات السلسلة التنفسية و بناء الحامض النووي متقصص الاوكسجين (DNA Deoxy ribonucleic acid)[2].

إن وجود الحديد بصورته الحررة في الجسم يعتبر مادة سامة ويكون عادة بكميات ضئيلة او غير محسوسة اذ يكون في اغلب حالاته مرتبط مع ناقله البروتيني الذي يعرف بالترانسفررين Transferrin او مخزون في الخلايا بشكل فرتين Ferritin او هيموسدررين [4,3] يتواجد الحديد بشكلين اساسيين هما الحديد العضوي Heme iron الذي يوجد بشكل اساسي في الأغذية الحيوانية التي تحتوي في تركيبها على الهيموكلوبين والحديد غير العضوي Non heme iron وهذا النوع من الحديد يتواجد في الاغذية النباتية [5].

يعتبر نقص الحديد من المشاكل الصحية التي تؤثر سلبا على الجسم اذ انه يقل قابلية الدم على نقل الكمية الكافية من الاوكسجين الذي تحتاجه الخلايا لنموها وادامه فعاليتها المختلفة [6]،كما ان زيادة كمية الحديد في الجسم تعتبر سامة وفي بعض الحالات ممكن أن يؤدي الى الموت نتيجة لتكوينه الى مجموعة من الجذور الحرية اهمها جذر البيروكسيل والهيدروكسيل عن طريق تفاعلات الفتنون Fenton reaction[7,2].

تتأثر الغدة الدرقية عند زيادة نسبة الحديد في الدم اذ تعمل جذور الحديد الحررة على مهاجمة انسجة الغدة الدرقية في مسببة تلف الخلايا الجريبية للغدة الدرقية وانخفاض مستوى هرمونات T₃ و T₄ الذي ينتج عنه حالة نقص الدرقية Hypothyroidism (8). تعتبر مادة الديسفروكسامين (DFO) Desferoxamin من أكثر الأدوية استخداما لعلاج حالات فرط الحديد والثلاثسيميما والتي بامكانها ان تمنع العديد من التأثيرات السلبية لحالات فرط الحديد حيث يتم اعطائها عضليا او تحت الجلد ونتيجة انصاف العمر القصير لهذه المادة لذا فهي تعطى عادة بجرعات ممتدة من 8 الى 12 ساعة بعد كل عملية نقل دم للاشخاص المصابين بالثلاثسيميما[9]، نتيجة لامتلاك هذه المادة العديد من التأثيرات السلبية منها طول فترة استخدامها اضافة الى الآلام والأورام المتسببة عند موقع الحقن وكونها مادة باهضة الثمن الامر الذي دفع الباحثين للبحث عن مواد بديلة تكون فعالة في علاج حالات فرط الحديد

نظرا للدور الوقائي للعديد من مضادات الأكسدة في علاج الكثير من حالات الإجهاد التأكسدي مثل فيتامين C و E جاءت فكرة استخدام زيت بذور العنبر لعلاج حالات فرط الحديد نتيجة لاحتواها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العديد من المشاكل الصحية المتسببة بفعل الجذور الحرية ومن اهمها مادة Oligomeric Proanthocyanidin Complexes (OPCs) اضافة الى انه غني بالعديد من الفيتامينات منها فيتامين C و E و مادة β-carotin وكذلك احتواه على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة اهمها Stearic acid و Palmitic acid ، Omega-3 ، Omega-6 ، Omega-9

المواد و طرائق العمل Materials and Methods

استخدمت في هذه التجربة 25 أرنب من ذكور الأرانب المحلية *Oryctataguscuniculus* و تراوحت اعمارها بين 8-9 أشهر واوزانها ما بين 1500- 2000 غرام تم شرائها من الأسواق المحلية و وضعت في اقفاص معدة لهذا الغرض في البيت الحيواني التابع الى كلية التربية – جامعة كربلاء ، اختبرت هذه الحيوانات لظروف مختبرية خاصة بدرجة حرارة 25 م ، وتم تغذيتها بعلقة من البلت المركز concentrate pullet واعتمدت الإضاءة الطبيعية طول مدة الدراسة وبوالغ 10 ساعات ضوء و 14 ساعة ظلام . تركت الحيوانات مدة أسبوعين للتأقلم مع الظروف المدارية المشار إليها اعلاه قبل اجراء التجربة . قسمت الارانب عشوائيا الى خمسة مجاميع بواقع 5أرانب لكل مجموعة :

تم حقن المجموعة الاولى (G1) 20 مل / كغم بالماء المقطر لمدة 30 يوم يوميا واعتبرت كمجموعة سيطرة . تم حقن المجموعة الثانية(G2) 20 ملغم / كغم من مادة دكستران الحديد لمدة 30 يوم بواقع جرعة واحدة في الاسبوع الاول ، جرutan في الاسبوع الثاني ، ثالث جرع في الاسبوع الثالث واربع جرع في الاسبوع الرابع.

تم حقن المجموعة الثالثة(G3) 20 ملغم / كغم من مادة دكستران الحديد لمدة 30 يوم بواقع جرعة واحدة في الاسبوع الاول ، جرutan في الاسبوع الثاني ، ثالث جرع في الاسبوع الثالث واربع جرع في الاسبوع الرابع +انها جرعت فمويا ب 0.5 مل / كغم من زيت بذور العنبر grape seed oil ولمدة 30 يوم يوميا.

حقنت المجموعة الرابعة (G4) 20 ملغم / كغم من مادة دكستران الحديد لمدة 30 يوم مع حقن تحت الجلد 10SC 10 ملغم / كغم من مادة الديسفلوكسامين ولمدة 30 يوم بواقع جرعة واحدة في الاسبوع الاول ، جرutan في الاسبوع الثاني ، ثالث جرع في الاسبوع الثالث واربع جرع في الاسبوع الرابع في الاسبوع الرابع +انها جرعت فمويا ب 0.5 مل / كغم من مادة الديسفلوكسامين ولمدة 30 يوم بواقع جرعة واحدة في الاسبوع الاول ، جرutan في الاسبوع الثاني ، ثالث جرع في الاسبوع الثالث واربع جرع في الاسبوع الرابع لكل مادة .

تم حقن المجموعة الخامسة(G5) 20 ملغم / كغم من مادة دكستران الحديد لمدة 30 يوم مع حقن تحت الجلد 10SC 10 ملغم / كغم من مادة الديسفلوكسامين ولمدة 30 يوم بواقع جرعة واحدة في الاسبوع الاول ، جرutan في الاسبوع الثاني ، ثالث جرع في الاسبوع الثالث واربع جرع في الاسبوع الرابع + انها جرعت فمويا ب 0.5 مل / كغم من زيت بذور العنبر ولمدة 30 يوم يوميا . تم سحب عينات الدم بعد تجويع الحيوانات لفترة المساء وحتى الصباح وذلك قبل اجراء التجربة وبعد نهاية كل اسبوعين حيث تم سحب 5 مل من الدم من القلب مباشرة عن طريق التحكم بالحيوان مستلق على ظهره ، وضع الدم بعد ذلك في انبيب خاصه غير حاوية على مادة مانعة للتختثر ثم فصل المصل بواسطة جهاز الطرد المركزي centerfuge بسرعة 3000 دوره/ دقيقة لمدة 15 دقيقة لقياس مستويات هرمون T_3 ، هرمون الثايروكسين T_4 ومستويات الهرمون المحفز للدرقة TSH .

قياس تركيز الهرمونات

تم اجراء قياس مستويات الهرمونات T_3 ، T_4 و TSH (TSH) باستخدام عدة التحاليل (Kits) الخاصة بكل هرمون من الهرمونات المذكورة آفأ والمنتجة من قبل شركة Biocheck-Inc الالمانية وبالاعتماد على الطريقة المناعية المعروفة Axiom Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) باستخدام جهاز Reader Minireader الالماني المنشأ واجريت الخطوات لقياس كل هرمون بالاعتماد على الخطوات الموافقة لكل طقم .

Histological sectioning

أخذت عينات نسيجة من الغدة الدرقية بعد قتل الحيوانات و قطعت الى عدة اجزاء ثم وضعت في الفورمالين المتعادل 10% مباشرة ، وعرضت لسلسلة الكحولات متتابعة التراكيز (60% ، 70% ، 80% ، 90% ، 100%) لازالة الماء منها . ثم الزايلين لغرض التوضيح وطمرت في البارافين ، وقطعت بسمك (5-6) مايكرومتر بصوره متسلسلة باستعمال المايكروتون الدوار Rotary Microtome ثم ثببت المقاطع النسيجية باستعمال بياض البيض والكليسيرين على شرائح زجاجية . ومررت الشرائح بالزايلين ثم بسلسلة من الكحولات واخيراً الزايلين وصبغت بصبغة هيماتوكسيلين- ايوسين stain Haematoxylin-Eosin بعدها اجريت عملية التحميل باستخدام بلسم كندا Canada Balsam لثبت غطاء الشرحية ثم تركت على صفيحة ساخنة لتجف لمدة 8 ساعات لتكون جاهزة للفحص المجهرى [10]

التحليل الاحصائي

تم الاستعانة بالبرنامج الاحصائي SPSS لعراض تحليل النتائج واستخدم تحليل التباين Anova table لتجربة عاملية 5X3X5 وفق التصميم العشوائي الكامل كما تم استخدام اختبار أقل فرق معنوي Least Significant difference(L.S.D) لأظهار معنوية النتائج . (11)

النتائج والمناقشة Results and Discussion

اظهرت النتائج انخفاض معنوي ($P<0.05$) في معدل مستويات هرمون T_3 و T_4 وارتفاع معنوي ($P>0.05$) في معدل مستويات هرمون TSH بعد الحقن العضلي بدكستران الحديد Iron dextran لمنطقة اربعه اسابيع وهي نتائج متفقة مع [14] ، [13,12,8]

تكون كمية الدم المزودة للغدة الدرقية قياسية مقارنة مع باقي انسجة الجسم ولها في تستلم كمية اضافية من الدم المحمل بالحديد الفائض وبالتالي المزيد من الجذور الحرارة التي تهاجم الخلايا الدرقية وتأثير على عملية بناء هرمونات T_3 و T_4 ، وقد يكون الانخفاض في تركيز الهرمونات الدرقية نتيجة لفعل الجذور الاوكسجينية الفعالة ROS التي تعمل على تثبيط الـ اليوديد

مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الرابع / علمي / 2011

الموجود بالدم من الخلايا الجريبية ومن ثم تثبيط فعالية انزيم البيروكسيديز (TPO)[15] ، اضافة الى التأثيرات السلبية للجهاز الناكسدي Oxidive stress على الغدة الدرقية اذ يعمل على تثبيط افراز انزيم deiodinase 5 ويثبت فعالية مستقبلات T₃ ويعلم على تحطيم البروتينات المسئولة عن نقل الهرمونات الدرقية Thyroxin Binding Globin (TBG)[16] ، او قد يكون الانخفاض نتيجة تاثير الجذور الحرة على اغشية الخلايا الدرقية، ومن جهة اخرى وجد هنالك ارتفاعاً معنوياً(P<0.05) في معدل مستويات هرمون TSH وقد فسر هذا الارتفاع [17,18] إلى زيادة ترسب الحديد في الغدة النخامية الذي ادى إلى خلل في افرازات هذه الغدة .

بينت النتائج عدم وجود فروق معنوية في قيمة الهرمونات TSH و T3 و T4 بعد التجريبي الفموي بزيت بذور العنبر مقارنة مع مجموعة السيطرة ، يبدو ان مضادات الاكسدة والفيتامينات التي يحتويها زيت بذور العنبر وبشكل اساسي فيتامين C تمكن من كسر نسبة عالية من جذور الحديد الحرة مما ادى الى تقليل تاثيرها على الغدة الدرقية والشخص وبالتالي المحافظة على مستويات الهرمونات المفرزة من تلك الغدة [19,20] ، حيث أن فيتامين C له تأثيرات معنوية في زيادة إفراز الغدة الدرقية لهرمون الدرقين (Thyroxin-T₄) ، اضافة الى دور الاحماظ الدهنية غير المشبعة مثل omega-3omega-6 مثل 6-3omega-3 التي تعتبر من الاحماظ الدهنية الاساسية في عملية بناء الهرمونات الدرقية وان نقصها يسبب حالة نقص الدرقية Hypothyroidism[21].

كما بينت النتائج وجود انخفاض معنوي (P<0.05) في مستوى الهرمونات T3 و T4 وارتفاع معنوي(P<0.05) في مستوى هرمون TSH بعد الحقن بمادة الديسفروكسامين وهذا يتفق مع [22,23]. ان هذا الانخفاض يكون نتيجة لتجمع الحديد في الغدة الدرقية بسبب مستويات الحديد المرتفعة في المصل والتي تتجاوز قدرة مادة الديسفروكسامين على التقاطها مما يسبب انخفاض في تركيز الهرمونات الدرقية والمنسليّة [24].

جدول (1) تاثير التجريبي الفموي بالجرعة المؤثرة لزيت بذور العنبر والديسفروكسامين على معدل مستويات هرمون TSH(mIU/ml) في مصل ذكور الارانب المعرضة لف्रط الحديد

LSD	20 ملغم/كغم دكستران الحديد + 10 ملغم/كغم ديسفروكسامين + 0.5 مل/كغم زيت بذور العنبر (G5)	20 ملغم/كغم دكستران الحديد + 10 ملغم / كغم ديسفروكسامين (G4)	20 ملغم/كغم دكستران الحديد + 0.5 مل / كغم زيت بذور العنبر (G3)	20 ملغم/كغم دكستران الحديد (G2)	السيطرة (G1)	المجاميعالمدة
0.052	a ± 0.02 BA	0.81 ± 0.02 B	0.79a ± 0.02 BA	0.81a ± 0.02 BA	0.80a ± 0.01 BA	0.84a ± 0.02 A
0.125	0.78a ± 0.02 D	b ± 0.07 C	1.42 ± 0.07 A	0.93b ± 0.02 A	1.66b ± 0.05 B	0.85a ± 0.01 DA
0.204	a $0.02 \pm$ A	0.75 $0.02 \pm$ A	2.02c $0.09 \pm$ D	1.03c ± 0.01 C	2.24c ± 0.12 B	0.78b ± 0.03 A
	0.0568		0.209	0.0537	0.218	0.056 LSD

المعدل \pm الخطأ القياسي ، n=5/ مجموعة
الحرروف الكبيرة تدل على وجود فروق معنوية افقيا تحت مستوى احتمال P<0.05
الحرروف الصغيرة تدل على وجود فروق معنوية عموديا تحت مستوى احتمال P<0.05

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد التاسع - العدد الرابع / علمي / 2011

جدول (2) تأثير التجريغ الفموي بالجرعة المؤثرة لزيت بذور العنب والديسفروكسامين على معدل مستويات هرمون جدول (2) تأثير التجريغ الفموي بالجرعة المؤثرة لزيت بذور العنب والديسفروكسامين على معدل مستويات هرمون T3 في مصل ذكور الارانب المعرضة لفرط الحديد

LSD	20 ملغم/كغم دكستران الحديد + 10 ملغم/كغم ديسفروكسامين + 0.5 مل/كغم زيت بذور العنب (G5)	20 ملغم/كغم دكستران الحديد + 10 ملغم / كغم ديسفروكسامين (G4)	20 ملغم/كغم دكستران الحديد + 0.5 مل / كغم زيت بذور العنب (G3)	20 ملغم/كغم دكستران الحديد (G2)	السيطرة (G1)	المجموع المدة
0.03	1.066a ±0.008 A	1.050a ±0.013 A	1.056a 0.010 ± A	1.040a ±0.010 A	1.060a 0.010± A	قبل المعاملة
0.096	1.086a ±0.013 A	0.860b ±0.060 C	b1.034 0.005 ± A	0.62b ±0.037 B	.048a ±0.011 A	بعد اسبوعين
0.07	1.158b ±0.020 D	0.480c ±0.037 C	1.010c ±0.004 A	0.200c 0.031± B	1.054a ±0.008 A	بعد اربعة اسابيع
	0.044	0.122	0.021	0.085	0.029	LSD

المعدل \pm الخطأ القياسي ، n=5/ مجموعة .
 الحروف الكبيرة تدل على وجود فروق معنوية افقيا تحت مستوى احتمال P<0.05
 الحروف الصغيرة تدل على وجود فروق معنوية عموديا تحت مستوى احتمال P<0.05


جدول (3) تأثير التجريغ الفموي بالجرعة المؤثرة لزيت بذور العنب والديسفروكسامين على معدل مستويات هرمون جدول (3) تأثير التجريغ الفموي بالجرعة المؤثرة لزيت بذور العنب والديسفروكسامين على معدل مستويات هرمون T4 في مصل ذكور الارانب المعرضة لفرط الحديد

المجموع المدة	السيطرة (G1)	20 ملغم/كغم دكستران الحديد (G2)	20 ملغم/كغم دكستران الحديد + 0.5 مل / كغم زيت بذور العنب (G3)	20 ملغم/كغم دكستران الحديد + 10 ملغم / كغم ديسفروكسامين (G4)	20 ملغم/كغم دكستران الحديد + 0.5 مل/كغم زيت بذور العنب (G5)	LSD
قبل المعاملة	1.090a 0.012± A	1.080a ±0.012 A	1.074a ±0.010 A	1.088a ±0.016 A	1.086a ±0.020 A	0.044
بعد اسبوعين	1.088a ±0.015 DA	0.700b 0.031 ± B	bc ±0.011 A	0.922b +0.038 C	1.122ab ±0.019 D	0.075
بعد اربعة اسابيع	1.094a ±0.025 DA	0.280c ±0.037 B	1.026c ±0.008 A	0.440c ±0.074 C	1.172b ±0.017 D	0.11
LSD	0.05	0.086	0.0297	0.146	0.0568	


المعدل \pm الخطأ القياسي ، n=5/ مجموعة .
 الحروف الكبيرة تدل على وجود فروق معنوية افقيا تحت مستوى احتمال P<0.05
 الحروف الصغيرة تدل على وجود فروق معنوية عموديا تحت مستوى احتمال P<0.05

كما بينت نتائج التقطيع النسيجي ان الحقن العضلي لدكستران الحديد ادى الى حدوث حالات نقص الدرقية Hypothyrodism التي شخصت من خلال انخفاض نسبة الغروان Colloid وزيادة عدد الخلايا الدرقية مع صغر حجمها وهي نتائج متفقة مع [24] الذين بين ان زيادة ترسب الحديد في الغدة الدرقية يؤدي الى ظهور حالة نقص الدرقية Hypothyrodism في مرضي الثلاسيميا نتيجة لتاثير جذور الحديد الحرة على الخلايا الدرقية كما اظهرت نتائج التقطيع النسيجي لانسجة الحيوانات المعاملة بـ 20 ملغم من دكستران الحديد والمجرعة يوميا بـ 0.5 مل / كغم من زيت بذور العنبر لم يؤدي الى وجود تغيرات في نسيج الغدة الدرقية مقارنة مع مجموعة السيطرة ويرجع السبب في ذلك الى النسبة العالية من مضادات الاكسدة التي يحتويها زيت بذور العنبر الذي تمكنت من التقاط نسبة عالية من جذور الحديد الحرة مما ادى الى تقليل تاثيرها على انسجة الكبد والخصى والغدة الدرقية [25,20] ، اضافة الى ذلك فان زيت بذور العنبر غني بفيتامين E الذي يعد من احسن مضادات الاكسدة الذائية في الدهون الذي له دور رئيسي في المحافظة على سلامة اغشية الخلايا والقليل من حدة الالتهابات من خلال تقليل انتاج البروستوكلاندين [26] كما انه يعمل على تقليل تاثير الجذور الحرة والعوامل المؤكسدة ووقف عملية بيروكسيدة الدهون Lipid peroxidation ، اضافة الى دور المركبات الفينولية ب ضمنها anthocyanin Proanthocyanidins في المحافظة على اغشية الخلايا وتاثيرها في كسر الجذور الحرة وتقليل تاثيرها على الانسجة [19].


اظهرت نتائج التقطيع النسيجي للغدة الدرقية انخفاض في نسبة الغروان مع صغر نسبي في حجم الخلايا الدرقية وهي نتائج متفقة مع [27] التي تبين حدوث حالات تلف في الغدة الدرقية حتى بعد استخدام الديسفروكسامين نتيجة لفعل جذور الحديد الحرة التي تعمل على مهاجمة اغشية الخلايا الدرقية والجرييات وبالتالي تؤثر على كمية المادة الغروانية .




صورة (1) مقطع نسيجي في الغدة الدرقية لذكور الارانب (مجموعة السيطرة) اذ يلاحظ التركيب الطبيعي للخلايا الجريبية → والمادة الغروانية ← (H&E 400X)




صورة (2) مقطع نسجي للغدة الدرقية لذكور الارانب التي حقن عضليا ب 20 ملغم / كغم من دكستران الحديد ولمدة اربعة اسابيع اذ يلاحظ صغر في حجم الجريبات ← وانعدام المادة الغروانية ← (H&E 400X)



صورة (3) مقطع نسجي للغدة الدرقية لذكور الارانب التي حقن عضليا ب 20 ملغم / كغم من دكستران الحديد و جرعت فمويا ب 0.5 مل / كغم من زيت بذور العنبر لمدة اربعة اسابيع اذ يلاحظ الحجم الطبيعي للجريبات ← والكمية ← الطبيعية من المادة الغروانية ← (H&E 400X)



صورة (4) مقطع نسجي للغدة الدرقية لذكور الارانب التي حقنت عضليا ب 20 ملغم / كغم من دكستران الحديد و مع حقن تحت الجلد ب 10 ملغم / كغم من مادة الديسفروكسامين لمدة اربعة اسابيع اذ يلاحظ نقصان في كمية المادة الغروية (H&E 400X) مع صغر حجم الجريبات



صورة (5) مقطع نسجي للغدة الدرقية لذكور الارانب المعرضة لفرط الحديد والتي حقنت ب 10 ملغم / كغم من مادة الديسفروكسامين مع التجريبي الفموي ب 0.5 مل / كغم من زيت بنور العنبر لمدة اربعة اسابيع اذ يلاحظ حجم الجريبات الطبيعي مع ملاحظة وجود المادة الغروانية بكميات طبيعية (H&E 400X)

المصادر

- 1-Bodnar ,L. M. ; Cogswell, M.E. & Scanlon ,K.S. (2002). Low income postpartum women and at risk of iron deficiency .J .Nutr.,132:2298-2302.
- 2-Hentze ,M. W. ; Muckenthaler , M. U. & Andrews ,N. C. (2004). Balancingacts :Molecularcontrol of mammalian iron metabolism .Cell ,117:285-297.
- 3-Franchini, M.; Targher, G.; Montagnana, M.; Lippi, (2008).Iron and Thrombosis. Ann. Hematol., 87:167-173.
- 4-Kohgo, Y. ;Ikuta, K.; Ohtake, T.; Torimoto, Y. &koto, J. (2008). Body iron metabolism and pathology of iron overload, int. J. Hematol., 88(1) : 7-15.
- 5-Conrad, M. E.; Umbriet, J. N. & Moore, E. G. (1999). Iron absorption and transport. AM. J. Med. Sci., 18: 213-229.
- 6-Guyton, A.C. & Hall, J.E., (2000).Text book of medical physiology. 6th, ed., Saunders Comp., London, U.K., 307-320.
- 7-Britton, R. S.; Tavill, A. S. & Bacon, B. R. (2004).Mechanism of iron toxicity.In : Iron Mechanism in Health and disease by Brock JH, Halliday, J.W.; Pippard, M.J.& Powell, L.M. (Eds). Inc. London : 311-351.
- 8-Agarwal ,M.B. ;Shah, S. ;Vishwanathan, C. ; Rajadhyaksha, G.; Bhave, A.A. ; Dube, S.R.; Billa, V.;Malkan, G. &Bajan, K. (1992). Thyroid Dysfunction In Multi-transfused Iron Loaded Thalassemia Patients. Indian pediatr. , 29(8): 997-1002.
- 9-Hershko , C. ; Abrahamov , A. ; Konijn , A. M. ; Breuer , W. ; Cabantchik , I. Z. ; Pootrakul , P. &Link , G. (2003) . Opjectives and methods of iron chelation Theraby .Bioinory .Chem .Appl ., 1:151-168 .
- 10-Presnell, J.K. &Schreibman, M.P. (1997).Humason's animal tissue techniques, 5thedn., John Hopkins Univ. Press, Balfimore, 546.
- 11-Spss . (1999).Statistical packages social sciences ,verion 10. USA
- 12-Fica ,S. ; Alice , A. ; Florentina ,V. ; Carmen .B. ;Roxana ,B. ;Larisa ,N. & Daniela ,M. (2005) .Endocrine disorders in β -thalassemia major : cross-sectional data – Acta.Endocrinologica , 1(2):201-212.
- 13-Shalitin, S.; Carmi, O.; Weintrob, N.; Phillip, M.; Miskin, H.; Kornreich, L.;Zilber, R.; Yaniv, I.&Tamary, H. (2005). Serum Ferritin Level as a Predictor of Impaired Growth and Puberty in Thalassemia Major Patients: Eur.J. Haematol.,74:32-43.
- 14-Pirinccioglu, A. G. ;Deniz,T. ; Gokalp,D. ;Beyazit, N. ; Haspolat, K. &Soker, M.(2011). Assessment of thyroid function in children aged 1-13 years with beta – thalassemia major. Iran J. Pediatr ,21(1): 77-82.
- 15-Cooper , D.S. (1984). Antithyroiddrugs.NewEngl.J.Med.,311:1353 – 1362.
- 16-Hedberg,N.(2009).UnderstandingThyroidImbalances,Part2. Hawthorn University Live Webinar, 120-127.
- 17-Bartalena, L.; Brogioni, S.;Grasso, L. & Martino, E.(1995) Interleukin-6 and the Thyroid: European J. Endocrinology, 132: 386-393.(Cited by Alexandrides et al., 2000).
- 18-Zervas, A.; Katopodi, A.; Protonotariou, A. ;Livads, S.; Karagiorga, M.; Politis, C.&Tolis, G. (2002). Assessment of Thyroid Function in two HandredPatients with β - thalassemia.Major ,12 (2):151-154.
- 19-Bagchi , D.; Sen ,C. K. & Ray ,S. D. (2003) . Molecular mechanisms of cardioprotection by anovel grape seed proan the cyanidin extract. Mutat.Res. ,523:87-97.
- 20-Choi, Y.&Lee,J.(2008) .Antioxidant vitamins reduce acute meal-induced memory deficits in adults with type 2 diabetes. Nutrition Research ,28(7):423-429.
- 21-Paoletti,J.(2008).Hypothyroidism,Functional Hypothyroidism, and Functional Metabolism. International Journal of Pharmaceutical Compounding ,12(6):489- 97.

- 22-Aoaud , F. ; Florence , A. ; Zhang , Y. ; Collins , F. ; Henry , C. ; Ward, R. J. &Crichton , R. R. (2002) . Evaluation of new iron chelators and TheirTherapeutic potential .Inorg .Chem .Acta. , 339:470-480 .
- 23-Brittenham , G. M. (2003) . Iron chelators and Toxicity .Alcohol ,30:151-158.
- 24- يكن ، سرباز ابراهيم محمد. (2007) حالة الحديد كدليل لتأخر النمو والنضج الجنسي لدى الاكراد المصابين بفقر الدم البحري الكبرى . اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم ،جامعة بابل .
- 25-Kim , S. ; Jeong , S. ; Park , W. ; Nam , K. C. ; Ahn , D. & Lee, S. (2006) . Effect of heating conditions of corape seeds on The oxidant activity of grape seed extract . Food Chemistry .97 : 472-479 .
- 26-Wen ,Y. ; Killales, S. ; Norris,L. A. ; Cooke, T.& Feely ,J. (1999). Vitamin E supplementaetion in hyperlipidaemicpatients : effect of increasing doses on vitro and low –density lipoprotein oxidation . Eur. J. Clin .Invest.,29:1027-1034.
- 27-Bhagwadin , C. A. (2009) . Formulation and invitro Evaluation of a novel drng delivery system containing achelating agent for the treatment of iron overload.Master thesis, University of west Indies.